

Ìó÷íèñòàý ḏíñà àáḏèêíñà è ñèèâû

Âíçáóäèòâèû — ñóí÷àòúé äḏèá Podosphaera tridactyla (Wallr.) De Barry, èç ïïḏýäèà Erysiphales. Â ìèèè÷èà ìò ìó÷íèñ èèñòüý, ḏáæá ìíèíäúâ ïíááâè àáḏèêíñà è ñèèâû. Íḏàæáííúâ ìḏááíú ïíèḏúâàḑòñý íáæíúì ìàóòèíèñòúì íáèáòì. Çááíèáááíèâ ḏááèí Íḏàæáííúâ èèñòüý æáèòíáàòí-èḏàñíúâ, ñèááèà áíèíèñòúâ. Â òá÷áíèâ èáòà äḏèá P. tridactyla ḏàñíḏíñòḏáíýáòñý ìḏè ìííúè éííèâ ìèì á àèàíáòḏá. Íḏèáàòèè ó ìñííááíèý' éíḏè÷íááúâ, ìà éííòàḑ áñòáááòíúâ, àèèû÷àòíḏàçááòáèáííúâ, ñóíèà íáíà, ïí÷òè íèḏóáèàý, àè 17—20X8—10 ìèì, ïí 8 á èàæáíé ñóíèâ. Íḏè ñèèúíí ïḏàæáíèè èèñòüý ìñúíàḑòñý, ìèíäú òáḏýḑò áéóñíáúâ èà÷áñòá. Ñáíḏ è ñæèááíèâ èèñòúââ. Íḏáíá ïḏúñèèááíèâ á ìḏèíá ìááòáíèý ïí÷áè 1%-é éíèèíèáííé ñáḏíé (8— 16 èâ/âà) ìḏíòèâ ìáç — ñḏàçó ïíñèâ òááòáíèý è áàèáâ 12—14-áíááíúìè éíòáḏáàèàìè. Äèý èáòíèḑ ïḏúñèèááíèè èñííèúçòḑò 0,8—