

Éóḍ÷àâîñòü èèñòüââ âèøíè è ÷âḍâøíè

Âîçáóäèòâèü — âîèî-ñòí÷àòüé ãḍèá Taphrina minor Sadeb. èç ïîðýäèà Taphrinales. Çááíèääáíèà ïḍÿäèýâòñý â äâòíḍ ïèàñòèíèè ḍíáíáý èèè ñèääèà áíèíèñòàý, èḍâý çàáíóòü èíèçó. Ḍàçíáḍ ââ óíáíüøààòñý. É ñâḍâáèíá èâòà íà èèñòüýḍ, äèàáíüí íáḍ Ñóíèè áóèèääíèèáíí-òèèèíäḍè÷âñèèâ, íà äâḍḍóḍèâ çàèḍóäèèáííüâ, ḍàçíáḍíí 18—35X6—8 íèì, àñèíñííḍü ḍàçíáḍíí 6—8 òḍâüèíàḍ èíḍü èèè äḍèáíèòâé â ïí÷èàḍ. Íáḍâè÷íá çàḍâæáíèâ ïḍíèñóííèò íáü÷íí ââñííé, â íà÷èâ ḍàñíóñèáíèý ïí÷èè. Ííḍâæáííüâ ïèèè èèñòüý. Ííḍâæáííüâ äâḍââüý ñèàáí íèíáííñýḍ. Ñóíáííá çááíèääáíèà íááèþáàòñý íà íèíáàèâ — âîçáóäèòâèü Taphrina ââñííé, íí è â íáâ, èíáââ ïḍèçíáèè áíèáçíè òíḍííí àèáíü. Á íáḍèíá ḍàñíóñèáíèý ïí÷èè èèè ïñáíüþ ïíñèâ ñáíḍâ óḍíæâý ïḍüñèèáíèà 1 èâ/âà èèáí 0,5%-é òèíḍíèèñüþ íáâè (90%-é ñ. í., 4—8 èâ/âà). Ñíèæáíèþ çááíèääáíèý ñííñíáñòâóâò òáèæâ ïñáííá ïḍüñèè èâ/âà). Ñḍàçó ïíñèâ òââḍáíèý è 10—20 áíáé ñíóñòý ýḍâèèòèáíí ïḍüñèèáíèà 0,4%-í òèíááíí (80%-é ñ. í., 4—8 èâ, (8—16 èâ) èèè 0,5 %-í èàìòâíí (50%-é ñ. í., 5—7,5 èâ/âà).