

Ñèđáíü íáúéííááíàÿ

Ñèđáíü íáúéííááíàÿ — Syringa vulgaris L. Ñàíáéñòáí àñééííáúá — Oleaceae Éóñòàđíéè èèè ááđááóí áúñíòíé 3— ñáđáÿ, ííéíáúá ííáááè çáéáíúá. Èèñòüÿ ñóíđíòéáíúá, ýéóááéáíí-ñáđáóááéáíúá, íà ÷-áđáøéáó. Óááòéè ñíáđáíü á íèđàíèááéúíúá á ñ íéíñéèíè ááóéđúéúíè ñáíáíàíè. Óááòáó á íáá.Đàñíđíñòđáíáíéá. Đàñòáó ïí áñáé òáđòéóíđèè ðæííé è óíáđáííé ííéíñú ĐÓ éáé áá òááòéáó, èèñòüÿó, ïí-éáó — éóíàđéííáúá íđíèçáíáíúá, óáííéáéèéíçéá ñèđéíáéí, óéááíííéáú, áóáééúíúá ááúáñòáá, ñííéú, á ááéñòáéáí, ñííñíáñòáóðò íòóíæááíèð íáñéá è èáííáé íđè ïí-áéáíáííé áíéáçíé; ïí-éè, ñíáđáííúá đáííáé ááñííé áí áđáíÿ íááóóáíéÿ, í (éóóéíçá) éáé ïíóíáíííá ñđááñòáí; ïí-éè ñèđáíé, ñíáđáííúá đáííáé ááñííé áí áđáíÿ íááóóáíéÿ, èñííéúçóðò íđè áééáđáé-áñééó çáá ñèđáíé íáúéííááííé đáéííáíáóðò íđè íáeyđéè, đááíàòéçíá, óóááđéóéáçá éááéèó, áđéíá, ÍĐÇ, ýçáá æáéóáéá, ñáóáđííí áéáááóá, đáñòáíéÿ íà 4 ÷-áñòè íàçááíé íñííáú). Íáñóíééó ñóóéó óááòéíá ñèđáíé íà 40 %-i ñíèđòá ýóóáéòéáíí íđéíéíáòú áíóòđú ïí 30— 1985).Ñííñíá íđéíáíáíéÿ: á áéáá íáñóíÿ (ñòíéíááÿ éíæéá óááòéíá, èèñòúáá èèè ïí-áé íà ñòáéáí èéíÿòéá) íáñóíÿòú á òá-áíéá 6 ÷,