

Ìĩõíâèè çǎëáí, Ḍǎøǎòèà

Ìĩõíâèè çǎëáí, Ḍǎøǎòèà - Xerocomus subtomentosus (L. ýõ Fr.) Quel. [Boletus subtomentosus (L.) Fr.]. Ḍĩññèéñêíǎ íàçǎàíèǎ - ìĩõ - èàçǎé, ñóõí-ǎḌèá ìĩññèèñòèé. Ēç ñǎìùè áíèǎòíáèõ - Boletaceae. Øǎíèà 3-10 ñì á èèàíǎòḌǎ, ìĩéóñóǎḌè-ǎñèàý, ìĩòì áúíóèéí Ḍǎñ ñóõàý, ìǎóíáàý, òííèḌ-ìĩññèèñòèà, ñ áíçḌǎñòì ìĩ-òè áíèà, èííǎǎà á òáíòḌǎ òḌǎùèííáàòàý. ØéóḌèà íǎ ñíèíàǎòñý. ÌḌú æǎèòú, ñ áíç 5,5 ìèì. Ííæèà [5-10 (12) X1-2 (3) ñì] ìèíóíáý, æǎèòàý, èḌæǎáí-éíḌè-ìpǎàòà, áíèà èèè çǎḌíèñòí áíèíéíèñòàý, èííǎǎà ñ íǎáúḌǎçèòǎ èḌǎñííáàòúé, ìḌè ḌǎçḌǎçǎíèè íǎ áíçǎóḌǎ íǎ èçíáíýǎò òǎǎò èèè èííǎǎà íǎ èíḌíòèíǎ áḌǎíý íǎííáí ñèíáǎò, ñ ìḌèýòíúì áéóñì è çǎíǎòì. ó Ēǎññòáíè. Ēñíèùçòpò áǎḌǎíúì, æǎḌǎíúì; áíḌíè ñóøǎò.