

# ÁóḌàý ìýòíèñòíñòù èèñòùáá, èèè öáḌêíñííḌíç

Áíçáóäèòáèù &mdash; íáñíááḌøáííúé áḌèá *Cercospora libicola* Ell. et Ev. èç ìíḌýäèà Hyphomycetales. ÈḌíà ÷áḌííé, ìḌàæàá ñááòéíé ñáḌááèííé, èíòíḌúá ìñòáíííí óááèè-èáàḑòñý è ñèèáàḑòñý, ìí èḌàḑ ìýòíá áíçíèèááò òáííúé íáíííé. Íà ìýòíáḌ ñ íááèò ñòíḌ èííèáèé. Èííèáèáííñòù ḌàçíáḌíí 25&mdash;50x3,5&mdash;4 ìèì, èíḌíòèèá, áóḌíáàòùá, ìḌýìúá èèè ñèááèà èíèáí-àòùá, èííááá ñ íá 35&mdash;95x3&mdash;4 ìèì, ìí-òè ááñòááòíúá, èáíòáòíáèáíúá, áóèááíáèáíúá èèè ìí-òè òèèèíáḌè-áñèèá, èííááá ñèááèà èçíá òñùòáḑò è ìíááàḑò, ÷òí ìòḌèòàòáèùíí ñèáçúáááòñý íá óḌíæáéííñòè. Íà èèñòùýò ñííḌíáèíú áñòḌá-ááòñý áḌóáíé áèèçèèé è ìḌáá Ḍàçáèáááòñý á áèáá òáíííáí íáèáòà ñ íèæíáé ñòíḌííú èèñòà. Èííèáèáííñòù ḌàçíáḌíí 150&mdash;200x3&mdash;4 ìèì ñíáḌáíú á ìò-100&mdash;120 ìèì, øèḌèííé 3&mdash;4 á íáíí èííòá è 1&mdash;2 ìèì á áḌóáíí, ááñòááòíúá, íáḌáòíí-áóèááíáèáíúá, ñ íáḌááíḌíá èóñòíá ñ òáèùḑ èò èó-øááí ìḌíááòḌèááíèý, ÑáíááḌáíáíáý è òùàòáèùíáý íáḌááíòèà ìí-áú á òýááò è íáæáóḌýáúýò. ÍíḌùñèèááíèá (3&mdash;3,5 èá/áà) íáḌáá òááòáíèáí, ñḌàçó ìíñèá öááòáíèý è ìíñèá ñáíḌá óḌíæáý. Óñòíé-èáíñòù ÷áḌííé ñííḌíáèíú çíà-èòáèùíí